

41

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
09.06.2021 № 1160
Реєстраційне посвідчення
№ UA/18779/01/01

ЗМІНИ ВНЕСЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
20.08.2021 № 1768

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

Ляньхуа Цінвень ФОРТЕ
(Lianhua Qingwen FORTE)

Склад:

діючі речовини: 1 капсула містить: Форзиція звисаюча (Плоди – 24,99 мг (Точне співвідношення 6,8:1,170 мг у еквіваленті на суху речовину)); Жимолость японська (Бутони або квітки, які розпускаються – 22,1 мг (Точне співвідношення 7,7:1,170 мг у еквіваленті на суху речовину)); Ефедра китайська або Хвойник середній (Трав'яний пагін (розтертий і запечений з медом) – 8,38 мг (Точне співвідношення 6,8:1,57 мг у еквіваленті на суху речовину)); Щитовник товстокореневищний (Кореневище та стебла – 9,1 мг (Точне співвідношення 7,7:1,70 мг у еквіваленті на суху речовину)); Вайда красильна (Корінь – 26 мг (Точне співвідношення 7,7:1,200 мг у еквіваленті на суху речовину)); Гіпс волокнистий (Мінерал – 22,1 мг (Точне співвідношення 7,7:1,170 мг у еквіваленті на суху речовину)); Ментол синтезований – 5 мг; Пачулі (Надземна частина (Точне співвідношення 100:1 (нестабільна олія) і 7:7 (водний екстракт), 27 мг у еквіваленті на суху речовину), Нестабільна олія – 0,27 мг, Водний екстракт – 3,51 мг); Родіола рожева (Корінь та кореневище – 20,41 мг (Точне співвідношення 7,7:1,157 мг у еквіваленті на суху речовину)); Гуттуїнія серцелиста (Надземна частина – 10,29 мг (Точне співвідношення 6,8:1,70 мг у еквіваленті на суху речовину)); Ревінь пальчастий (Корінь та кореневище – 5 мг (Точне співвідношення 6,8:1,70 мг у еквіваленті на суху речовину)); Абрикос звичайний (Стигле насіння (розтерте та запечене) – 7,41 мг (Точне співвідношення 7,7:1,57 мг у еквіваленті на суху речовину)); Солодка уральська (Корінь та кореневище – 20,41 мг (Точне співвідношення 7,7 : 1,157 мг);

допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, желатин, барвник діамантовий синій (Е 133), тартразин (Е 102), титану діоксид (Е 171).

Лікарська форма. Капсули.

Основні фізико-хімічні властивості: капсули з коричневим порошком, із легким запахом, трохи гірким на смак.

Фармакотерапевтична група. Традиційний лікарський засіб рослинного походження.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Немає даних.

Фармакокінетика.

Немає даних.

Клінічні характеристики.

Показання.

Цей традиційний китайський лікарський засіб сприяє виведенню теплотоксинів із легень та полегшує такі симптоми, як підвищена температура, озноб, біль у м'язах, закладеність носа та нежить, сухість та біль у горлі, жовтий жирний наліт на язиці.

Протипоказання.

Не рекомендується застосування препарату при наявності виразки шлунково-кишкового тракту, розладів печінки або нирок, індивідуальної чутливості до будь-яких компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не застосовувати, якщо ви нещодавно приймали інгібуючі засоби із моноаміноксидазою. У разі паралельного вживання інших лікарських засобів перед початком прийому препарату проконсультуйтеся з лікарем китайської традиційної медицини.

Особливості застосування.

Не застосовувати для лікування звичайної застуди. Не перевищувати рекомендовану дозу та не приймати препарат більше 7 днів, окрім випадків коли це робиться за рекомендацією лікаря. У разі наявності серцевих захворювань, хвороб щитовидної залози, високого кров'яного тиску, діабету, глаукоми, проблеми з урінацією внаслідок збільшення передміхурової залози або при паралельному вживанні інших лікарських засобів перед вживанням проконсультуйтеся з лікарем. При застосуванні більше 7 днів проконсультуйтеся із лікарем китайської традиційної медицини.

Ляньхуа Цінвень ФОРТЕ є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

Користувач повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати під час вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

У рекомендованих дозах не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Приймати з теплою водою. 3 рази на день по 4 капсули.

Під час прийому препарату рекомендовано відмовитися від алкоголю та жирних продуктів.

Діти.

Немає даних.

Передозування.

У випадку появи будь-яких незвичних реакцій слід проконсультуватися з лікарем.

Побічні реакції.

Припинити застосування препарату при появі нудоти, блювання, болю у животі, кров'янистого стільця, головного болю або запаморочення.

Термін придатності. 30 місяців.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці в прохолодному та сухому місці.

Упаковка.

По 12 капсул у блістері, по 2 блістери в 1 пакетику, по 1 пакетику в картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Шицзячжуан Ілін Фармасьютікал Ко., Лтд.

Місцезнаходження виробника та його адреса провадження його діяльності.

238 вул. Тяньшань, Зона промислового розвитку високих і нових технологій, Шицзячжуан, провінція Хебей, Китай.

Дата останнього перегляду.

Тест утворено.
21.07.2021

